



Opis

Klobuk ove gljive naraste obino od 8 pa ?ak do 25 centimetara u ?irinu, konveksan dok je mlad, spljo?ten u starosti. Boja klobuka je obino u nijansi sme?e boje. Stru?ak je obino 3 do 5 centimetara ?irok, bijele boje, te pri dnu prili?no debeo; ima prsten. Listi?i su obino ?u?kaste boje, te su gusto raspore?eni. Otisak spora je bijele boje.

Kemijske reakcije

Kalijev hidroksid reagira s mesom stvaraju?i naran?asto obojenje. Srebrov nitrat s mesom reagira stvaraju?i crnu boju, dok meso s amonijakom daje tamno plavo obojenje.

Stani?te

Ova vrsta obino raste u vi?im dijelovima, obino u blizini crnogori?nog drve?a, iako se ponekad mo?e na?i i u ni?im dijelovima, uz <http://www.plantsmedicinal.com/herbs-beech.php?lang=hrv> i drugo sli?no drve?e. Raste diljem Europe, Azije i u pojedinim dijelovima Sjeverne Amerike.

Doba

Ova vrsta raste tijekom devetog i desetog mjeseca, ranije od obi?ne muhare.

Jestivost

Sme? a muhara je ?estoko otrovna. Nije toliko otrovna kao pupavke, ali je otrovnija od obi?ne muhare.

Sli?ne vrste

Ova vrsta bi se mo?da mogla zamijeniti s obi?nom muharom, iako muhara obino dolazi u intenzivnijim bojama, te su joj stru?ak, prsten i listi?i potpuno bijele boje.