



Opis

Klobuk ove gljive mođe narasti od 7 pa do 21 centimetar u đirinu. Kao i kod veđine ostalih vrganjevki, oblik kape je konveksan. Boja klobuka mođe biti sive, smeđe ili crvene boje, ali najđeđe dolazi u nekoj nijansi ili kombinaciji navedenih boja. Pore su sitne i okrugle, te su izduljene prema struđku. U pođetku su đute boje, a kasnije postaju zelene. Na prerezu mijenjaju boju u plavu. Otisak spora je maslinasto smeđe boje.

U reakciji s eljezovim sulfatom nastaje tamno plavo ili tamno zeleno obojenje. U reakciji s kalijevim hidroksidom meso postaje ruđiđasto naranđaste boje.

Staniđte

Raste kraj [hrastova](http://www.plantsmedicinal.com/herbs-oak.php?lang=hrv), [grabova](http://www.plantsmedicinal.com/herbs-beech.php?lang=hrv) i [bukava](http://www.plantsmedicinal.com/herbs-beech.php?lang=hrv), đesto u druđtvu teđkog vrganja. Ova vrsta mođe se nađi u razliđitim dijelovima Europe.

Doba

Lađna ludara raste prvenstveno između sedmog i devetog mjeseca, iako se ponekad mođe nađi neđto ranije, ali i kasnije od navedenog raspona vremena.

Jestivost

Jestiv, ali treba biti dobro termiđki obrađen, i ne bi se trebao jesti u prevelikim koliđinama.

Sliđne vrste

Mođe se zamijeniti otrovnom ludarom (Boletus satanas). Ipak, od navedene vrste lađna ludara se razlikuje po tome đto ima crvene dijelove i po klobuku, a uz to nema lođ miris koji kod otrovne ludare mođe podsjeđati na strvinu ili đeđnjak.