

Boletus torosus

Opis

Klobuk teškog vrganja naraste od 7 do 17 centimetara u širinu. Klobuk je konveksno spljoštenog oblika već u ranoj mladosti a takav je i u starijih primjeraka. Kožica je suha i hrapava, te može doći u raznim bojama, od žućkastih i zelenih, pa sve do crvenih nijansi. Meso inače na dodir prvo poplavi, a zatim pocrni. Pore su relativno kratke, prvo žute, pa zelene boje, također mijenjaju boju. Otisak spora je maslinaste boje.

Kemijske reakcije

Nema značajnijih podataka.

Stanište

Raste u toplijim krajevima, uz rub hrastovih ili bukavih šuma, a često i na istinama u travi. Može se naći u kolonijama u većem broju primjeraka. Prvenstveno raste u području Mediterana.

Doba

Ova gljiva raste prvenstveno kroz deveti i deseti mjesec, iako se ponekad može naći i nešto ranije.

Jestivost

Vrlo ukusna i aromatična vrganjevka, koja rijetko bude crvljiva. Bitno je napomenuti da je potrebno meso ove vrste dovoljno temeljito obraditi jer je sirovo otrovno.

Slične vrste

Ova vrsta donekle je slična ruževaši (Boletus purpureus), koja je češća u hladnijim predjelima. Za razliku od teškog vrganja, promjena boje ruževaše ne završava crnom bojom.