



Opis

Klobuk može biti od 3 do 7 centimetara širok, dok visok može biti i preko 15 centimetara. Kod mladih primjeraka, klobuk je elipsoidno izduljen. U starijih primjeraka, klobuk poprima oblik zvona. Inače je cijela gljiva bijele boje, dok stariji primjerci na pojedinim dijelovima mogu biti blago smeđe boje. Stručak je valjkast i upalj, te na dnu blago zadebljan. Listići su vrlo gusti te su u ranoj dobi bijele boje, a kasnije tamne i pretvaraju se u tekućinu nalik na tintu. Otisak spora je crne boje.

Kemijske reakcije

Donji dijelovi kore struča s gvajakolom daju plavkasto zelenu boju, dok meso struča poprima zlatno žutu boju u reakciji s eljezovim sulfatom.

Stanište

Relativno rjeđa vrsta koja raste po travnatim površinama, pogotovo ako su nagnjene. Može izrasti i u naseljima, uz puteve, na gnoju, u parkovima, uz rijeke. Uspijeva u raznim vrstama vegetacije. Ova vrsta se prvenstveno može naći u Europi, Sjevernoj Americi i Australiji.

Doba

Ova gljiva raste u proljeće, od četvrtog do šestog mjeseca, te nakon toga ponovno u jesen, od devetog do dvanaestog mjeseca.

Jestivost

Vrlo cijenjena i ukusna gljiva. Bitno je napomenuti da se za jelo prvenstveno koriste primjerci koji nisu potamnili, pa čak niti poželji tamniti (u početnoj fazi, prvo se pojavi crvenkasta boja).

Slične vrste

normal;">Gotovo da i ne postoji mogućnost da se ova gljiva zamijeni nekom otrovnom vrstom. Eventualno je moguća zamjena sa nekom od drugih gljiva iz roda Coprinus, kod kojih u pravilu u početnim fazama propadanja, listi?i ne poprimaju crvenu boju.</p> <p style="display: inline !important;">
</p> <p>◆</p> </p> <p>◆</p>