



Opis

Klobuk je širok od 5 do 15 centimetara, relativno spljošten, dok je na tjemenu ponekad sasvim ravan. Tjeme mu je najtamnije obojeno - ?esto tamno sme?e ili crno, dok prema rubovima boja postaje sve svijetlija. Stru?ak je pun i tvrd, ve?inon valjkast, ?esto zavinut i ne?to zadebljan pri dnu. Listi?i su prirasli uzlazno, te su veoma gusti i tanki, ve?inom bijele boje a stariji poprimaju svijetlo sme?u boju. Otisak spora je bijele boje.

Kemijijske reakcije

Nema zna?ajnijih podataka.

Stani?te

Ova vrste potje?e iz Japana gdje raste i uzgaja se na posebnim vrstama drveta, ali mo?e uspjeti i na [bukva](http://www.plantsmedicinal.com/herbs-beech.php?lang=hrv), [kesten](http://www.plantsmedicinal.com/herbs-chestnut.php?lang=hrv) i [hrast](http://www.plantsmedicinal.com/herbs-oak.php?lang=hrv)ovima. Zbog toga se sve vi?e uzgaja i u drugim dijelovima svijeta pogotovo zbog svojih ljekovitih svojstava.

Doba

Ova vrsta raste gotovo cijele godine, u valovima, ?esto u razmacima od oko dva mjeseca, pod uvjetom da je temperatura cijelo vrijeme iznad 10?C.

Jestivost

Vrlo ukusna i cijenjena gljiva, koja se na brojne na?ine mo?e upotrebljavati. Ima brojna ljekovita svojstva, te je jedna od njezinih karakteristika mogu?nost vrlo brzog i efikasnog sni?avanja kolesterola.

Sli?ne vrste

normal;">Ponekad se može zamijeniti s razornom ?ehavkom (Pholiota destruens) koja se razlikuje od shiitake-a po tome što ima sme?i otisak boja.</p> <p></p></p>