



**Opis**

Tijelo ove gljive je u po?etku bijele boje, zatim sme?kasto. Obi?no je tikvastog oblika s tim da je gore ire dok je dolje ue. Cijela povr?ina ove gljive pokrivena je u sitne bijele bodlje koje se lako mogu slomiti i skinuti s povr?ine. Kada spore sazriju, na povr?ini gljive se obi?no stvori otvor kroz kojeg spore izlaze van u obliku pra?ine. Same spore ove gljive su sme?e boje.

**Stani?te**

Ova vrsta nije specifi?no u vezi s niti jednom vrstom drve?a, tako da se mo?e na?i u svim vrstama uma, pa i na livadama. Ova vrsta mo?e se na?i diljem Europe i Sjeverne Amerike.

**Doba**

Ova se gljiva mo?e na?i od ?etvrtog, pa sve do jedanaestog mjeseca.

**Jestivost**

Jestiva i ukusna gljiva, ali je bitno napomenuti da se koriste prvenstveno mlade gljive, kod kojih je meso u presjeku potpuno bijelo.

**Sli?ne vrste**

Ova vrsta ne mo?e se zamijeniti niti sa jednom otrovnijom vrstom. Od drugih puhara, najslinija joj je smrdljiva puhara (Lycoperdon foetidum) koja za razliku od tikvaste puhare ima neugodan miris. Kod svih puhara op?enito vrijedi pravilo da vie nisu dobre za jelo kad meso vie nije bijele boje.