



Opis

Klobuk bukova?e naraste od 7 do 24 centimetara u irinu, te je polukruan i na rubovima obi?no malo zavinut. Klobuk mo?e biti razli?itih boja - od razli?itih nijansa sme?e i sive boje, pa ?ak do plavkastog obojenja. Stru?ak je lateralan i zakrivljen, te je obi?no relativno kratak, a ponekad se uop?e niti ne razvije. Listi?i su bijeli, svijelo sme?e boje ili pak sivi, obi?no se produuju i po stru?ku. Otisak spora je svijetlo sme?e ili blago ru?aste boje.

Kemijske reakcije

Meso u reakciji sa sumpornom kiselinom postaje sme?e crvene boje. Listi?i u reakciji s sulfovanilinom postaju prvo crvene boje, a zatim ljubi?aste.

Stani?te

Raste na razli?itom listopadnom drve?u, obi?no u ve?em broju. Mo?e se na?i na [bukvama](http://www.plantsmedicinal.com/herbs-beech.php?lang=hrv "bukva"), [orasima](http://www.plantsmedicinal.com/herbs-walnut.php?lang=hrv "orah"), [vrbama](http://www.plantsmedicinal.com/herbs-white-willow.php?lang=hrv "vrba"), [topolama](http://www.plantsmedicinal.com/herbs-poplar.php?lang=hrv "topola"), i drugim vrstama drve?a. U Europi i Sjevernoj Americi relativno ?esta gljiva.

Doba

Bukova?a raste obi?no od desetog pa do tre?eg mjeseca, dakle radi se o vrsti koja preferira hladnije vrijeme. Iako, postoje pojedine podvrste koje rastu i u drugim razdobljima kroz godinu.

Bukova?a raste obi?no od desetog pa do tre?eg mjeseca, dakle radi se o vrsti koja preferira hladnije vrijeme. Iako, postoje pojedine podvrste koje rastu i u drugim razdobljima kroz godinu.

Jestivost

Vrlo ukusna i cijenjena gljiva. Može se pripremati na različite načine, od kiseljenja pa do pohanja.

Sljedeće vrste

Postoje pojedine druge vrste koje rastu na drvim te bi se eventualno mogle zamijeniti bukova? ama, ali te vrste u pravilu imaju uvijek tvr? e meso od bukova? a i obično nemaju listi? e, tako da je lako utvrditi da se ne radi o bukova? ama.